



ที่ อบ ๘๗๒๐๑ / ว ๒๖๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลระเว
อำเภอพิบูลมังสาหาร อบ ๓๔๑๑๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก (Dengue Fever)

เรียน กำนันตำบลระเวและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พบผู้ป่วยสะสม ๓๐๕ ราย อัตราป่วย ๐.๔๖ ต่อประชาชนแสนคนและพบผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน ๒ ราย ประกอบกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีปริมาณฝนรายเดือนและรายปีของประเทศไทยสูงขึ้น ๑๗.๙ เท่าเมื่อเทียบกับค่าปกติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้มียุงลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก จึงคาดว่าจะมีการระบาดใหญ่อีกครั้งโดยอาจพบผู้ป่วยตลอดทั้งปีถึง ๙๕,๐๐๐ ราย และหากมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกร่วมด้วยอาจทำให้มีอาการรุนแรง ส่งผลให้ยากต่อการรักษาและมีโอกาสเสียชีวิตมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อการนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระสันต์ สมโคตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

สำนักปลัด

อบต.ระเว

โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๒๗๓๒




ชุมชนปลอดภัย

ห่างไกลไข้เลือดออก ป้องกันด้วย

5 ป.

+

1 ข.




ปิด

ปิดภาชนะที่
เก็บกักน้ำ




เปลี่ยน

เปลี่ยนน้ำ
ในภาชนะ
ทุก 7 วัน




ปล่อย

ปล่อยปลา
กินลูกน้ำ



ปรับปรุง

สิ่งแวดล้อม
ไม่ให้เป็น
แหล่ง
เพาะพันธุ์
ยุง



ปฏิบัติ

ปฏิบัติเป็น
นิสัย
สม่ำเสมอ



ฉีด

ฉีดภาชนะ
ไม่ให้ยุงลาย
เกาะไข่




ทำอย่างไรเมื่อเป็นไข้เลือดออก



ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสโรคไข้เลือดออกโดยตรง การรักษาโรคนี้จึงเป็นการรักษาตามอาการและประคับประคองให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเองได้ ดังนี้

- ถ้าผู้ป่วยมีไข้สูง ควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อลดไข้
- หากจำเป็นต้องใช้ยาลดไข้ ควรใช้ยาพาราเซตามอล ห้ามใช้ยาแอสไพริน เพราะมีผลทำให้เลือดออกง่ายกว่าปกติ
- หากมีอาการอ่อนเพลียให้ดื่มน้ำผลไม้ หรือเกลือแร่บ่อยๆ



การป้องกันโรคไข้เลือดออก


มาตรการ ๕ ป. ๑ข

1. ปิด - ปิดฝาภาชนะให้สนิท
2. ปล่อย - ปล่อยปลากินลูกน้ำ
3. เปลี่ยน - เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้
4. ปรับ - ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลาย
5. ปฏิบัติ - ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
6. ชัด - ชัดล้างไข่ในภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดไข่ยุงลาย เพียงเท่านี้ ก็สามารถป้องกันไม่ให้ยุงลายเป็นพาหะนำโรคติดต่อมาได้อย่างสบาย



โรคไข้เลือดออก

Dengue fever



ด้วยความปรารถนาดี จากสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
สายด่วนโทร : 099-2035111

