



ที่ อบ ๘๗๒๐๑ / ว ๑๑๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลระเว
อำเภอพิบูลมังสาหาร อบ ๓๔๑๑๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคคอตีบในสุกร (ASF)

เรียน กำนันตำบลระเวและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประชาสัมพันธ์โรคคอตีบในสุกร (ASF)

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้กระทรวงมหาดไทย ประสาน การปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคคอตีบในสุกร (ASF) ทาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จึงเรียนมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กำหนดอย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบมาตรการจากกรมปศุสัตว์ และหากพบสุกรป่วยหรือตายผิดปกติ ให้แจ้งเหตุให้ทราบผ่าน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๑๗

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อการนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระสันต์ สมโคตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

สำนักปลัด

อบต.ระเว

โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๒๗๓๒




AFRICAN SWINE FEVER


โรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร



เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดโรคจะทำให้ตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและวิธีการรักษาที่จำเพาะ เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากได้นานหลายเดือน ประเทศที่มีการระบาด จะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม




อาการของโรค



ตายเฉียบพลัน มีไข้สูง ผื่นแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะในหู ก้อง ขาหลัง



มีอาการทางระบบอื่น เช่น ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร การแท้งในทุกช่วงของการตั้งท้อง




พบทุกกลุ่มและทุกช่วงอายุ



อัตราป่วย 100% อัตราตาย 30-100% ในลูกสุกร อัตราตายสูง 80-100% ภายใน 14 วัน

การติดต่อของโรค

การสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย การหายใจเอาเชื้อเข้าไป การกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน การโดนเห็บที่มีเชื้อกัด



เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่ปนเปื้อนเชื้อสามารถแพร่กระจายไวรัสได้

การระบาดของโรค

1 ส.ค. 2561 สาธารณรัฐประชาชนจีน พบการระบาดของโรคนี้และมีแนวโน้มแพร่กระจายในวงกว้าง ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่เคยพบการระบาด



เมื่อพบสุกรป่วยตายผิดปกติ/มีอาการตามนิยามโรค

- การป้องกัน : เข้มงวดระบบการป้องกันโรค เช่น รั้วแหล่งที่มาของสุกร ห้ามคนนอกเข้าฟาร์ม เป็นต้น
- แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือ หรือติดต่อ Call center : 063-225-6888 หรือแจ้งผ่าน Application DLD 4.0 (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
- ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรออกจากฟาร์ม



Download on the App Store



GET IT ON Google play



กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



1 ห้าม

นำเศษอาหารจากครัวเรือนใช้เลี้ยงหมู



ฟาร์มที่นำเศษอาหารจากครัวเรือนมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงหมูในฟาร์ม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู ถือเป็นปัจจัยของการติดเชื้อไวรัส ASF ได้ โดยเชื้อไวรัสมีอยู่ตามธรรมชาติในซากสัตว์ที่ตายแล้ว โรคอหิวาต์แอฟริกัน (ASF) ที่มักพบกระจัดกระจายในฟาร์มขนาดเล็กหรือที่ทำการเลี้ยงแบบหลังบ้าน รวมถึงการนำเศษอาหารมาใช้เลี้ยงหมู

2 ห้าม

นำเนื้อหมูจากแหล่งอื่นเข้าไปกินในฟาร์ม



ห้ามนำอาหารทุกชนิดเข้าไปกินในเขตเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเนื้อหมู ฟาร์มควรจัดให้มีโรงอาหารที่แยกออกจากเล้าหมู และมีแม่ครัวทำอาหารให้พนักงานเพื่อการป้องกันแหล่งที่มาของอาหารจากภายนอกที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรค

3 ห้าม

ให้สัตว์พาหะเข้าไปในเขตฟาร์มหมู



สัตว์พาหะสามารถนำโรคจากการปนเปื้อนเชื้อจากฟาร์มหนึ่งไปยังอีกฟาร์มหนึ่ง เช่น โค กระบือ สุกร หมู และโดยเฉพาะ หมูป่า หมูป่าพื้นเมือง ที่เป็นพาหะที่สำคัญของโรคอหิวาต์แอฟริกัน การป้องกันสัตว์พาหะสามารถทำได้โดย การจัดทำรั้วรอบฟาร์มให้มิดชิด รวมถึงโปรแกรมจัดการภายในฟาร์ม เช่น ซัดเบื้อนหมู เป็นต้น

4 ห้าม

ให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมฟาร์ม



ฟาร์มควรให้อนุญาตเฉพาะคนที่สามารถตรวจสอบได้ว่า **ไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงและมีการพักโรคตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว** เท่านั้นถึงจะอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มได้ ทุกคนที่เข้าไปในเขตฟาร์ม จะต้องอาบน้ำ เปลี่ยนชุดฟาร์ม อุปกรณ์ที่จำเป็นจะนำเข้าฟาร์มต้องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV 5 นาที และ ให้เปลี่ยนรองเท้าบู๊ทที่หน้าเล้าก่อนเข้าเล้าทุกครั้ง

5 ห้าม

นำอุปกรณ์หรือของใช้ส่วนตัวเข้าฟาร์ม



ควรค้นหาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวเข้าไปในเขตฟาร์ม ยกเว้นอุปกรณ์ที่จำเป็นเท่านั้น และก่อนนำเข้าฟาร์มจะต้อง **ฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV อย่างน้อย 5 นาที** และควรนำสิ่งของออกจากกระบะเป่า หรือย่ำเพื่อให้ฆ่าเชื้อได้ทั่วพื้นผิวของวัตถุ

6 ห้าม

ให้รถขนส่งจากภายนอกฟาร์มเข้าเขตฟาร์ม



ห้ามรถ แอกรถขนส่งที่ใช้วิ่งระหว่างภายในและภายนอกเขตเลี้ยงสัตว์ โดยฟาร์มจะต้องมีจุดล้างล้อรถกับแปรงขนที่เข้าฟาร์ม และใช้รถขนส่งที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์ม และใช้รถขนส่งที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์ม และใช้รถขนส่งที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์ม

7 ห้าม

รถลูกค้าเข้ามาซื้อหมูที่ฟาร์ม



เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคที่มาจากลูกค้า เนื่องจากเป็นจุดที่มีการเชื่อมโยงจากจุดขายเนื้อสุกร โรงฆ่าและ ฟาร์มรายอื่น ไปถึงฟาร์มต้นทางได้ การป้องกันโรคทางกายวิภาคศาสตร์ทำได้โดยการ ห้ามรถลูกค้าเข้ามาซื้อหมูที่ฟาร์มโดยตรง โดยจะต้องมี เล้าขายกลางที่อยู่นอกฟาร์ม ห่างจากฟาร์มอย่างน้อย 3 กิโลเมตร หรือรถขนส่งที่ควบคุมได้ส่งหมูไปให้ลูกค้า เพื่อจะได้ควบคุมค่าความสะอาดได้ตามมาตรฐาน

8 ห้าม

รับหมูทดแทนจากพื้นที่เสี่ยงเข้าฟาร์ม



การซื้อหมูทดแทนเข้ามาในฟาร์มอย่างต่อเนื่อง ทำให้โอกาสที่เชื้อโรคจะปนเปื้อนจากฟาร์มต้นทางที่ผลิตหมูพันธุ์และระยะเวลาขนส่ง แล้วแพร่เข้าสู่ฟาร์มปลายทางได้ การป้องกันโรคสามารถทำได้โดย การผลิตหมูทดแทนในฟาร์มหรือ การปิดฟาร์ม (Herd Closure) หรือ การกักโรคหมูทดแทนที่รับเข้ามาใหม่ในฟาร์ม เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโรคที่สำคัญก่อนนำเข้าฟาร์มและก่อนใช้งาน

9 ห้าม

นำน้ำจากภายนอกเข้าไปใช้ในฟาร์ม



ถ้าเป็นน้ำที่นำมาจากแหล่งน้ำที่ไม่สะอาด ก็มีโอกาสนำโรคเข้าสู่ฟาร์มได้ แนวทางป้องกันทำได้โดย **การใช้น้ำบาดาล หรือน้ำที่มีระบบบำบัดน้ำ** เช่นระบบประปา หรือวิธีการบำบัดด้วยสารละลายคลอรีน และตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนนำไปใช้ในฟาร์ม

10 ห้าม

ขายหรือนำหมูป่วย/ตาย ออกนอกฟาร์ม



งดขายหมูป่วยหรือหมูตายออกนอกฟาร์ม โดยเด็ดขาด ต้องทำลายในเขตฟาร์มเท่านั้น เพราะจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคจากลูกค้าที่มารับ (มาจากฟาร์มอื่นหรือพื้นที่เสี่ยง) และมีความเสี่ยงจากการนำโรคไปแพร่ให้ฟาร์มอื่น และที่สำคัญ **ผิดกฎหมาย!**

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลระเว