



ที่ อป ๘๗๒๐๑ /ว๑๒๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลระเว
อำเภอพิบูลมังสาหาร อป ๓๔๑๑๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศแจ้งเตือนโรคภัยและอุบัติภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว

เรียน กำนันตำบลระเวและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ฉบับ

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วตั้งแต่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยลมที่
พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตรถึงความสูง ๓,๕๐๐ เมตรเปลี่ยนเป็นลม
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป เปลี่ยนเป็นลม
ฝ่ายตะวันตก ประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง^๑
อย่างไรก็ตามช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกในบางช่วง ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้จะส่งผลให้เกิดโรคภัยหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดกับ คน สัตว์ และพืช
รวมถึงอุบัติภัยต่างๆ ล้วนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยหนาว และลดอันตรายที่อาจจะเกิด^๒
จากภัยที่มากับสภาพภาวะอากาศหนาวเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลระเวจึงขอความร่วมมือจากท่าน
ประชาชนสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบและระมัดระวังโรคภัยและอุบัติภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว
ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อการนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระสันต์ สมโคตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

สำนักปลัด

อบต.ระเว

โทรศัพท์ ๐๘๕-๒๕๒๗



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว

ด้วยกรณีอุบัติภัยได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย ก.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ว่าประเทศไทยได้เริ่มน้ำตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓,๕๐๐ เมตร เป็นลมที่วันออกเย็นเหมือนหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงดังกล่าว ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป เป็นลมฟ้าอากาศที่พัด ประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสภาพอากาศดังกล่าวจะส่งผลให้อากาศแห้งและอาจจะก่อให้เกิดภัยและอุบัติภัยอันเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูหนาว

ดังนั้น กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อม ระมัดระวังภัยและอันตรายจากอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

๑. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง สมใส่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เพื่อป้องกันความหนาว
๒. ดูแลผลผลิตทางการเกษตร ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการที่เปลี่ยนแปลง
๓. ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ประเภทป้ายเตือน ป้ายแนะนำและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรง หากพบว่า มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชน หรือเกิดชำรุดให้เร่งดำเนินการแก้ไขซ่อนแซ่อนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

๔. ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยจากการใช้ไฟเพื่อประกอบอาหาร การเตรียมที่ที่การเกษตร เช่น การเผาหญ้า ขังข้าว หรือเพื่อจับสัตว์ เป็นของมีส่วนภัยมากแล้วและมีล้มแรง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยอุบัติภัยใหม่ๆ ได้

๕. หากพบเห็นเหตุเพลิงใหม่ ขอความร่วมมือช่วยกันดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อป้องกันการลุกไหม้และแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้อำนวยการห้องดับและนายอำเภอห้องห้องท่องเที่ยวฯ และแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ทราบทันที ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๓๔-๔๖๔๗ หรือสายด่วนนิรภัย ๑๙๙๙ สายด่วนศูนย์ลั่นปลุก หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ สายด่วนหน่วยดับเพลิงที่๗๗ ๑๙๙ และสายด่วนสถานีตำรวจนครบาล ๑๑๙

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙๒ พฤษภาคม ก.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิรุจ วิชัยบุตร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ



**ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนโรคที่มานในช่วงฤดูหนาว**

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศในหลายพื้นที่เริ่มเย็นลงและบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่ ซึ่งอาจทำให้เปลี่ยนแปลง รวมถึงความชื้นและความหนาเย็นจะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหลายชนิด สามารถแพร่ระบาดได้ง่าย ซึ่งโรคที่มักเกิดในฤดูหนาวและพบได้บ่อยได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคอุจจาระร่วง โรคมือเท้าปาก โรคลูกลิ้น และโรคหัด กลุ่มเสี่ยงที่อาจป่วยได้ง่ายในช่วงฤดูหนาวนี้ ได้แก่

๑. เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปี

๒. ผู้สูงอายุ

๓. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตราย เป็นต้น เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักมีด้าน寒โน่นโรคตัว จึงติดเชื้อง่ายและการรุนแรงกว่าคนทั่วไป

ข้อแนะนำและวิธีการป้องกันควบคุมโรคในช่วงฤดูหนาว มีดังนี้

๑. ไม่กุศลคลื่นไส้เด็กกับผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยง่าย

๒. ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นหวัด ไอ จาม เช่น ผ้าเช็ดหัว แก้วน้ำ จาน เป็นต้น

๓. ควรเพิ่มการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ ๕ หมู่

๔. ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ

๕. หากมีไข้สูงเกิน ๒ วัน ควรพบแพทย์ทันที

อนึ่งในช่วงตั้งแต่เดือนปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้อัตราการติดเชื้อจะลดลง และกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศยกเว้นโควิด-19 จึงทำให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง แต่ยังพบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ จึงขอแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตนตามหลัก "D-M-H-T-T-A" เพื่อความปลอดภัย ต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและระวังโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้ทราบถึงอันตราย ระมัดระวัง และปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและคนใกล้ชิดต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิวัฒน์ วิชัยบุญ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการจังหวัด อุบลราชธานี
ผู้อำนวยการจังหวัด



**ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรหารสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนโรคเมล็ดสัตว์พืชที่ระบาดในช่วงฤดูหนาว**

ด้วยกรณีอุบัติเหตุได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ก. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ดังนี้เริ่มนั้นเป็นต้นไป โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยต่ำกว่า ๒๗ องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็น เกือบทั่วไปปัจจุบันนี้ และพิศวงลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓,๕๐๐ เมตร เป็นลมเด่นเฉพาะวันออกเดินทางนี้หรือลมต่อวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงถึงแต่ ๕,๐๐๐ เมตรนี้ไปเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับบริเวณและการกระจายของบริเวณประเทศไทยต่ำกว่า ๘๐๐ เมตร อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง อุ่นใจตามช่วงเริ่มนั้นของฤดูหนาวในปีนี้ บริเวณประเทศไทยต่ำกว่า ๘๐๐ เมตร ในบางช่วง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพเดินทางอากาศในช่วงนี้จะส่งผลให้โรคเมล็ดสัตว์พืชระบาด ทำความเสียหาย แก่พืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น ข้าว พืชผัก และไม้ดอก ดังนั้น ในช่วงฤดูหนาวนี้ กมตกรจึงการ เตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังสัตว์พืชที่มีระบาดในช่วงฤดูหนาว ซึ่งสัตว์พืชที่มีผลกระทบต่อความหนาแน่นให้แก่

๑. ข้าว โรคระบาดที่สำคัญของข้าวในช่วงฤดูหนาว คือ

๑.๑ โรคใบจุดสีน้ำตาล อาการ แหล่งที่ใบข้าว มักจะพบในระยะข้าวแตกกอ ลักษณะ เป็นจุดสีน้ำตาลรูปกลมหรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของแผลมีสีเหลือง บางครั้งพบแผลไม่เป็นวงกลมหรือรูปไข่ แต่จะเป็นรอยเปื้อนคล้ายสนิมกระჯัดกระชายทั่วไปบนใบข้าว แหล่งข้าวสามารถเกิดบนเมล็ดข้าวเปลือก (โกรเมล็ดด่าง) บางแหล่งมีขนาดเล็ก บางแหล่งอาจใหญ่กลมเมล็ดข้าวเปลือก ทำให้เมล็ดข้าวเปลือกแตก เสื่อมคุณภาพ เมื่อนำมาปลูกข้าวสารจะหักง่าย การแพะรับประทานเกิดจากสปอร์ของเชื้อราปัลวิปatham และติดกับเมล็ด

๑.๒ โรคกรบทบหนา จะเกิดกับข้าวทุกรายละเอียดเมื่ออากาศเย็นกว่าปกติ ข้าวโดยทั่วไป จะแสดงอาการเหล่านี้ การเจริญเติบโตช้าลง เนื่องจากกระบวนการต่างๆ ในต้นข้าวจะหักจากอากาศที่หนาวเย็น จะใส่ปุ๋ยอย่างไรก็ไม่เป็นผลหรืออาจหยุดการเจริญเติบโตจนตายหากอุณหภูมิลดต่ำลงมาก

๒. พืชผัก โรคเมล็ดสัตว์พืชที่สำคัญของพืชผักในช่วงฤดูหนาว คือ

๒.๑ หนองคีน จะพบในผักกระถุงลงหล้า โดยเฉพาะผักดอง กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดขาว ผักตระกูลถั่ว เช่น ถั่วลันเตา ตัวหนองคีนมีสีเขียวอ่อนจะกัดกินได้และยอด

๒.๒ หนองน้อยผัก เป็นสัตว์กินผักตระกูลลงหล้าและผักกาด ลักษณะการเข้าทำลาย จะชนใน

๒.๓ หนองกระทู้ผัก เป็นสัตว์กินพืชตระกูลลงหล้า หรือพืชผักอื่น เช่น ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวกระน้ำ หวานดั้ง กะหล่ำดอก บล็อกโคลี เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเข้าทำลายพืชอื่นๆ เช่น หน่อไม้ฟรัง หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเจี๊ยบเขียว พริก ญี่午 ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถุงล้าน ดาวเรือง และกล้วยไม้ได้ด้วย ลักษณะการเข้าทำลายของหนองน่องจะเข้าทำลายเป็นกลุ่ม ระยะต่อมาจะทำลาย รุนแรงมากขึ้น เมื่อจากเป็นหนองที่มีขนาดใหญ่ หนองสามารถกัดกินใน ก้าน ในการเข้าทำลายมักเกิดเป็น หย่อนๆ ตามจุดที่ตัวเดินรัศมียาวไปและมักแหรรษาระบาดได้รวดเร็วลดลงทันที

๑๒.๔ ด้วงหนังผัก...


๓. สำนักงานได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ที่มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบในประกาศฯ ที่เสนอ จึงได้มีการตัดสินใจให้ประกาศฯ ออกเป็นประกาศฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ประกาศฯ ใช้ได้ทันที แต่ต้องรอให้รัฐสภาอนุมัติ จึงจะถือเป็นกฎหมาย แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ ประกาศฯ จะถูกยกเลิก

ดังนั้น ให้ออกประกาศฯ ให้ใช้ได้ทันที แต่ต้องรอให้รัฐสภาอนุมัติ จึงจะถือเป็นกฎหมาย แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ ประกาศฯ จะถูกยกเลิก

จึงประกาศตามที่ได้ระบุไว้ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


 (นาย ศุภชัย ชัยยงค์)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา



**ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนโรคระบาดในสัตว์ที่มาในช่วงฤดูหนาว**

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓,๕๐๐ เมตร เปลี่ยนเป็นลมที่วันออกเย็นหนึ่งหรือสองวันออก ล้วนลมระดับบนที่ความสูงดังต่อไปนี้ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง อห่างไธกิตามในช่วงเริ่มน้ำทั้งฤดูหนาวในปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกในบางช่วง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้จะส่งผลกระทบต่อสัตว์เสียง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีก สัตว์กีบคู่ และสัตว์น้ำ อาจปรับตัวไม่ทันต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายหากดูแลไม่ดี และสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ส่งผลให้สัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงเกิดเจ็บป่วยและล้มตาย เกษตรกรจึงควรเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์อันอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งโรคระบาดในสัตว์ที่มีภัยพิบัติในช่วงฤดูหนาว มีดังนี้

๑. สัตว์ปีก ได้แก่ เป็ดไส่หุ่ง ไก่ชน และไก่พื้นเมือง เกษตรกรควรเฝ้าระวังดูแลสุขภาพสัตว์ปีกของตนเองอย่างใกล้ชิด ให้สัตว์ปีกนอนในที่แห้งๆ หรือในเล้า หรือโรงเรือนที่มีหลังคาและผนังป้องกันลมฝนได้ร่วนหักซึ่งสัตว์ปีกป้องกันโรค จะช่วยให้สัตว์ปีกแข็งแรง ต้านทานโรคได้เป็นอย่างดี

๒. สัตว์กีบคู่ ได้แก่ โค กระบือ และสุกร โรคที่เกษตรกรควรระวังในโคและกระบือ ได้แก่ โรคคอบworm หรือโรคไข้ในราชบูฤกษาหรือไข้เมีย เป็นโรคที่มีความรุนแรงในกระบือ สัตว์จะหายใจหอบ มีเลือดดังคอกหรือหัวนมบวมแดง ตายอย่างรวดเร็วภายใน ๑-๒ วัน สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบworm นอกจากนี้ยังมีโรคป่า และเห้เปือย เป็นโรคติดต่อที่สำคัญในโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถติดต่อและแพร่กระจายได้ด้วยการลัมพ์เข้ากับสัตว์ป่ายโดยตรงหรือกับเชื้อที่ป่นปี้่อนจากผู้คน และ yanพานะ เป็นต้น โดยการหายใจหรือการกิน เนื่องจากเชื้อไวรัสจะถูกขับออกมากจากสัตว์ป่ายทางลมหายใจ น้ำมูก น้ำลาย น้ำนมและมูล สัตว์ที่ป่วยจะชิม มื้อชี้ เปื้ออาหาร มีเม็ดตุ่นพองเกิดขึ้นที่ริมฝีปาก ช่องปากและไร้กิน ทำให้น้ำลายไหล กินอาหารไม่ได้และเดินไม่สะดวก ในโภณอาจมีเม็ดตุ่นที่เต้านมทำให้เต้านมอักเสบได้ เนื่องจากโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสจีโนมี่ไวรัสชา แต่จะใช้ยาชันชา ยาหากินหรือยาฆ่าวัวเพื่อลดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนเท่านั้น โรคที่อาจพบการระบาดได้ในช่วงนี้ คือโรค PRRS ซึ่งเป็นโรคในสุกร ไม่ติดต่อถึงคน แต่เชื้ออาจจะแพร่ระบาดไปยังรากเรือ สุกรที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้ หอบ ไอ ผิวหนังบวมแดง ไม่มีแรง หากสุกรห้องจะแห้งหรือสูญเสียก้อนคลอด หรืออ่อนแอ แคระแกร็น โลชั่น จึงขอให้ผู้เลี้ยงสุกรเข้มงวดการป้องกันโรคเข้าสถานที่เลี้ยงสุกร โดยแยกเลี้ยงสุกรใหม่เพื่อต่ออาการก่อนนำเข้าร่วมผูงอย่างน้อย ๑ เดือน ต้องทำลายเชื้อโรคที่อาจติดมากับยานพาหนะและคนก่อนเข้าสถานที่เลี้ยงสุกรด้วยการฉีดยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง และในช่วงที่มีโรคระบาดในพื้นที่ควรลดการนำสุกรเข้าสื้อใหม่และให้ปรึกษาปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด

/๓. สัตว์น้ำ...

๒.๔ ตัวหนึ่งมีคือ ลักษณะการเข้าทำลาย จะกัดกินในชนพุน มักจะเป็นตัวรูของผัก
กะหล่ำและผักกาด ตัวอ่อนชอบกินรากหรือหัวในพืช ตัวเต็มวัยจะกัดกินในชนพุน ชอบทำลายเป็นพิเศษในผัก
ที่มีกลิ่นอุ่น

๒.๕ โรคนานี้ถ้า อาการส่วนใหญ่จะเกิดบนใบ โดยจะเริ่มจากจุดเหลืองแล้วขยายต่อมา
จะค่อยๆ ขยายไปเป็นลักษณะเม็ดเป็นเหลี่ยมตามแนวใบหรือข่ายของเส้น vein ขณะเดียวกัน
หากความชื้นในอากาศสูง เช่น ในระยะที่มีฝนบ่อยหรือแมลงน้ำค้างจัด ทางผ่านได้ในครั้งกับจุดเหลืองที่เกิดขึ้น
จะพบกลุ่มของเส้นใบและสปอร์ของเชื้อสาเหตุลักษณะเป็นขุย หรือผงสีเทาซึ่งเมื่อแกะหรือแผะแห้ง
จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ในกรณีที่เกิดกรุณแรงและถึงแผลล้มหายใจในส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในต้นอาจถูกเชื้อ^{เชื้อ}
เข้าทำลายอย่างรุนแรง ทำให้ใบหักไปแห้งตาย ต้นจะ茵มอาจถึงตายได้ทั้งต้น สำหรับลูกแพร์มักจะไม่ถูกเชื้อ^{เชื้อ}
เข้าทำลายโดยตรง แต่เมื่อต้นเป็นโรคก็จะมีผลทำอ่อน เช่น เจริญเดิบโคลไม้เดิมที่ แคร์แกร็น คุณภาพและ
รสเสียไป

๓. มีต่อไป โรคราบที่สำคัญของไม้ดอกในช่วงฤดูหนาว คือ

๓.๑ โรคราเป็น เช่น ดอกกุหลาบ ลักษณะอาการคือ มีเชื้อราสีขาวลักษณะคล้ายแป้ง
เกิดปกคลุมผิวใบ และอาจขยายลุกลามปกคลุมกึ่งและล้ำต้นทำให้ใบเหลือง ต่อมากลายเป็นสีน้ำตาลใบและ
กึ่งแห้ง ส่วนมากเกิดกับใบอ่อน ยอดอ่อน และดอกอ่อน

ทั้งนี้ สามารถขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำจาก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ
ในพื้นที่และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

ดังนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคแพร่กระจายตัวที่ที่ระบาดในช่วงฤดูหนาว
ของอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนให้ประชาชน
รับทราบและเฝ้าระวังการระบาดของโรคแพร่กระจายตัวที่ในช่วงฤดูหนาวดังกล่าว

จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิรุจ วิริยะบุญ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ